

Мировой лидер в селекции
сахарной свеклы




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2026 г.



www.sesvanderhave.com/by





БОМБЕР СМАРТ

Одноростковый диплоидный гибрид Z - типа



Толерантность
к ризомании



Устойчив к
цветущности



Дружные
всходы




Стабильный



Сахаристый

Включен в Госреестр по всем зонам
свекловодства в 2026 году



НОВИНКА!
Технология
КОНВИЗО® СМАРТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ

	Период вегетации, дн	180-210
	Средняя масса корнеплода, г	717
	Погруженность в почву, %	70-80
	Форма корнеплода	ширококоническая
	Розетка листьев (форма)	полупрямостоячая

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

УРОЖАЙНОСТИ

	Тип гибрида	Z - сахаристый
	Максимальная урожайность в ГСИ	845 ц/га
	Максимальная сахаристость в ГСИ, %	20,6

СРОКИ

УБОРКИ ГИБРИДОВ





NZ

ТЕРРАПИН СМАРТ

Одноростковый диплоидный гибрид NZ - типа

НОВИНКА!
Технология
КОНВИЗО® СМАРТ



Включен в Госреестр по всем зонам свеклосеяния в 2026 году



ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ

	Период вегетации, дн	180-210
	Средняя масса корнеплода, г	701
	Погруженность в почву, %	75-90
	Форма корнеплода	широко - коническая
	Розетка листьев (форма)	полупрямостоячая

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

УРОЖАЙНОСТИ

	Тип гибрида	NZ - нормальносахаристый
	Максимальная урожайность в ГСИ	794 ц/га
	Максимальная сахаристость в ГСИ, %	19,8

СРОКИ

УБОРКИ ГИБРИДОВ





КИПУНДЖИ СМАРТ

Одноростковый диплоидный гибрид
N типа



Толерантность
к ризомании



Устойчив к
цветущности



Устойчивость
к церкоспорозу



Дружные
всходы



Маленькая
розетка



Стабильный

Включен в Госреестр по всем зонам
свекловодства в 2023 году



ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ

	Период вегетации, дн	180-210
	Средняя масса корнеплода, г	661
	Погруженность в почву, %	75-90
	Форма корнеплода	цилиндро-коническая
	Розетка листьев (форма)	полупрямостоячая

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

УРОЖАЙНОСТИ



Тип гибрида

N - нормальный



Максимальная урожайность
в производстве

860 ц/га



Максимальная
сахаристость в ГСИ, %

20,2

СРОКИ

УБОРКИ ГИБРИДОВ



Сентябрь



Октябрь



АГРОНОМ



Толерантность
к ризомании



Устойчив к
цветушности



Период уборки
среднеранний



Погруженность
в почву



Сахаристый

Включен в Госреестр по всем зонам
свеклосеяния в 2015 году



ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ

	Период вегетации, дн	180-210
	Средняя масса корнеплода, г	729
	Погруженность в почву, %	80-95
	Форма корнеплода	коническая
	Розетка листьев (форма)	полураскидистая

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

УРОЖАЙНОСТИ

	Тип гибрида	Z - сахаристый
	Максимальная урожайность в ГСИ	815 ц/га
	Максимальная сахаристость в ГСИ, %	19,3

СРОКИ

УБОРКИ ГИБРИДОВ



АНАКОНДА

Z



Толерантность
к ризомании



Устойчив к
цветущности



Период уборки
среднеранний



Погруженность
в почву



Сахаристый

Включен в Госреестр РБ по всем
зонам свеклосеяния в 2018 году

к мучнистой росе

к церкоспорозу

к ризомании

к цветущности

0 2 4 6 8 10

УСТОЙЧИВОСТЬ

К БОЛЕЗНЯМ И ЦВЕТУЩНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ

	Период вегетации, дн	180-210
	Средняя масса корнеплода, г	675
	Погруженность в почву	средняя
	Форма корнеплода	ширококоническая
	Розетка листьев (форма)	полураскидистая

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

УРОЖАЙНОСТИ



Тип гибрида

Z - сахаристый



Максимальная
урожайность в ГСИ

848 ц/га



Максимальная
сахаристость в ГСИ, %

20,0

СРОКИ

УБОРКИ ГИБРИДОВ





МАНИТУ



Толерантность
к ризомании



Устойчив к
цветущности



Период уборки
среднеранний




Прибыльный



Погруженность
в почву

Включен в Госреестр по всем зонам
свекловодства в 2021 году



УСТОЙЧИВОСТЬ

К БОЛЕЗНЯМ И ЦВЕТУЩНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ

	Период вегетации, дн	180-210
	Средняя масса корнеплода, г	626
	Погруженность в почву, %	средняя
	Форма корнеплода	ширококоническая
	Розетка листьев (форма)	полупрямостоячая

до 662 ц/га

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

УРОЖАЙНОСТИ



Тип гибрида

Z - сахаристый



Максимальная урожайность в ГСИ

759 ц/га



Максимальная сахаристость в ГСИ, %

20,5

СРОКИ

УБОРКИ ГИБРИДОВ



Сентябрь



Октябрь

БУКОВИНА

NZ

Одноростковый диплоидный гибрид NZ - типа



Толерантность
к ризомании



Устойчив к
цветущности




Дружные
всходы



Стабильный

Включен в Госреестр по всем зонам
свекловодства в 2026 году



УСТОЙЧИВОСТЬ

К БОЛЕЗНЯМ И ЦВЕТУЩНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ

	Период вегетации, дн	180-210
	Средняя масса корнеплода, г	746
	Погруженность в почву, %	70-80
	Форма корнеплода	ширококоническая
	Розетка листьев (форма)	полупрямостоячая

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

УРОЖАЙНОСТИ



Тип гибрида

NZ - нормально-сахаристый



Максимальная урожайность в ГСИ

839 ц/га



Максимальная сахаристость в ГСИ, %

20,3

СРОКИ

УБОРКИ ГИБРИДОВ



Сентябрь

Октябрь



МАРУН



Толерантность
к ризомании



Устойчив к
цветущности



Период уборки
сентябрь-октябрь



Погруженность
в почву



Стабильный

НОВИНКА!

Включен в Госреестр РБ по всем
зонам свеклосеяния с 2025 года



ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ

	Период вегетации, дн	180-210
	Средняя масса корнеплода, г	929
	Погруженность в почву, %	75-90
	Форма корнеплода	цилиндро-коническая
	Розетка листьев (форма)	промежуточная

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

УРОЖАЙНОСТИ



Тип гибрида

NZ - нормально-сахаристый



Максимальная урожайность в ГСИ

851 ц/га



Максимальная сахаристость в ГСИ, %

20,0

СРОКИ

УБОРКИ ГИБРИДОВ



РИНО



Толерантность
к ризомании



Устойчив к
цветущности



Период уборки
поздний




Прибыльный



Погруженность
в почву

Включен в Госреестр по всем зонам
свекловодства в 2016 году



УСТОЙЧИВОСТЬ

К БОЛЕЗНЯМ И ЦВЕТУЩНОСТИ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

УРОЖАЙНОСТИ



Тип гибрида

NZ - нормально-
сахаристый



Максимальная
урожайность в ГСИ

856 ц/га



Максимальная
сахаристость в ГСИ, %

19,0

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ



Период
вегетации, дн

180-210



Средняя
масса корнеплода, г

641



Погруженность
в почву, %

70-80



Форма
корнеплода

ширококоническая



Розетка
листьев (форма)

полупрямостоячая

СРОКИ

УБОРКИ ГИБРИДОВ



Сентябрь



Октябрь



УРАГАН



Толерантность
к ризомании



Устойчив к
цветущности



Период уборки
среднеранний




Погруженность
в почву



Сахаристый

Включен в Госреестр РБ по всем
зонам свеклосеяния в 2019 году



УСТОЙЧИВОСТЬ

К БОЛЕЗНЯМ И ЦВЕТУЩНОСТИ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

УРОЖАЙНОСТИ



Тип гибрида

NZ - нормально-сахаристый



Максимальная
урожайность в ГСИ

925 ц/га



Максимальная
сахаристость в ГСИ, %

19,0

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ



Период
вегетации, дн

180-210



Средняя
масса корнеплода, г

748



Погруженность
в почву

средняя



Форма
корнеплода

ширококоническая



Розетка
листьев (форма)

полупрямостоячая

СРОКИ

УБОРКИ ГИБРИДОВ



Сентябрь



Октябрь

ФЕДЕРИКА



Толерантность
к ризомании



Устойчив к
цветущности



Период уборки
поздний



Высокая
продуктивность



Погруженность
в почву

Включен в Госреестр по всем зонам
свеклосеяния в 2009 году



УСТОЙЧИВОСТЬ

К БОЛЕЗНЯМ И ЦВЕТУЩНОСТИ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

УРОЖАЙНОСТИ



Тип гибрида

NZ - нормально-
сахаристый



Максимальная
урожайность в ГСИ

964 ц/га



Максимальная
сахаристость в ГСИ, %

20,2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ



Период
вегетации, дн

180-210



Средняя
масса корнеплода, г

807



Погруженность
в почву, %

85-90



Форма
корнеплода

цилиндрикоконическая



Розетка
листьев (форма)

промежуточная

СРОКИ

УБОРКИ ГИБРИДОВ



Сентябрь



Октябрь



ЭКСПЕРТ



Толерантность
к ризомании



Период уборки
сентябрь-октябрь



Погруженность
в почву




Маленькая
розетка



Стабильный

Включен в Госреестр по всем зонам
свеклосеяния в 2013 году



УСТОЙЧИВОСТЬ

К БОЛЕЗНЯМ И ЦВЕТУЩНОСТИ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

УРОЖАЙНОСТИ



Тип гибрида

NZ - нормально-
сахаристый



Максимальная
урожайность в ГСИ

1180 ц/га



Максимальная
сахаристость в ГСИ, %

18,4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ



Период
вегетации, дн

180-210



Средняя
масса корнеплода, г

700-750



Погруженность
в почву, %

80



Форма
корнеплода

коническая



Розетка
листьев (форма)

полупрямостоячая

СРОКИ

УБОРКИ ГИБРИДОВ



Сентябрь

Октябрь

КРОКОДИЛ



Толерантность
к ризомании



Устойчив к
цветущности



Период уборки
поздний




Высокая
продуктивность



Погруженность
в почву

Включен в Госреестр по всем зонам
свекловодства РБ в 2005 году



УСТОЙЧИВОСТЬ

К БОЛЕЗНЯМ И ЦВЕТУЩНОСТИ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

УРОЖАЙНОСТИ



Тип гибрида

N - нормальный



Максимальная
урожайность в ГСИ

942 ц/га



Максимальная
сахаристость в ГСИ, %

18,3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ



Период
вегетации, дн

180-210



Средняя
масса корнеплода, г

745



Погруженность
в почву, %

70-80



Форма
корнеплода

коническая



Розетка
листьев (форма)

промежуточная

СРОКИ

УБОРКИ ГИБРИДОВ



Сентябрь



Октябрь

	Бомбер Смарт	Z
	Террапин Смарт	NZ
	Кипунджи Смарт	N
	Агроном	Z
	Анаконда	Z
	Маниту	Z
	Буковина	NZ
	Марун	NZ
	Рино	NZ
	Ураган	NZ
	Федерика	NZ
	Эксперт	NZ
	Крокодил	N

Sesvanderhave International BV
Представительство
в Республике Беларусь



223610 г.Слуцк,
Минская обл.,
ул. Головащенко, 6-317



+375 29 198 01 47



8(01795)2 22 44



A.Naplanovich@sesvanderhave.com



www.sesvanderhave.com/by